


CASOS CLINICOS


Caso 1


- Hombre de 50 años., fumador, con enfisema. Nódulo de 2 cm en el TAC, mal definido




Se realiza reseccion quirúrgica













Diagnostico

- NO es un adenocarcinoma in situ
- Adenocarcinoma invasor, predominantemente papilar, con subcomponente micropapilar
- Linfonodos resecados: micrometastasis




1. Se diagnostica AIS en biopsias pequeñas?





NO

Caso 2

Hombre de 70 años, carpintero, fumador hasta hace 10 años. Tos y dificultad respiratoria
Al Tac nódulo de 3 cm. Se toma biopsia percutánea









Cual es su diagnóstico?


1. Adenoma alveolar mucinoso
2. Adenocarcinoma con patrón lepidico
3. Adenocarcinoma, in situ, mucinoso
4. Hiperplasia adenomatosa atípica
5. Adenocarcinoma mucinoso


Caso 3

Mujer de 42 años exfumadora, con diagnóstico reciente de ca de mama. Se encuentra en Tac nódulo en vidrio esmerilado de 0.8 cm en la periferia del pulmón. Biopsia transbronquial fue no diagnóstica, Se realiza VATS , Se pide Intraoperatoria.









Cual es su diagnóstico


1. Hiperplasia adenomatosa atípica
2. Metástasis de cancer de mama
3. Adenocarcinoma in situ
4. Adenocarcinoma invasor
5. Adenocarcinoma minimamente invasor (MIA) con crecimiento lepidico.


Caso 4


- Mujer de 52 años, fumadora, en contro de salud se encuentra nódulo pulmonar de 3 cm.
- Se realiza biopsia transbronquial


ANDRA,8552980-3
:DIASTINO 1.0 I31f 3













Cual es su Diagnóstico

- Adenocarcinoma pobremente diferenciado
- Carcinoma de célula grande
- Tumor carcinoide
- Carcinoma neuroendocrino



TTF-1



SINAPTOFISINA